



ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ/СПИД

ВИЧ - ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ, МОЖЕТ ИМЕТЬ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ.

СПИД - ЭТО СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА, ПОЗДНЯЯ СТАДИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ



ПРИ НЕЗАЩИЩЕННЫХ ПОЛОВЫХ КОНТАКТАХ



ЧЕРЕЗ НЕСТЕРИЛИЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ И ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ЧЕРЕЗ СПЕРМУ, ГРУДНОЕ МОЛОКО, ВАГИНАЛЬНЫЙ СЕКРЕТ



ЧЕРЕЗ КРОВЬ И ПРЕДМЕТЫ, СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ С КРОВЬЮ

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ



ЧЕРЕЗ РУКОПОЖАТИЕ И ПОЦЕЛУИ



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕЙ ПОСУДЫ, ПОЛОТЕНЦ И ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ



ПРИ КАШЛЕ, ЧИХАНИИ, ЧЕРЕЗ СЛЮНУ, СЛЕЗЫ ИЛИ ПОТ



ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ДЕНЬГИ, ДВЕРНЫЕ РУЧКИ, ПОРУЧНИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА)

Ваш Роспотребнадзор

ВИЧ-инфекция - хроническое инфекционное заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, характеризующееся специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее разрушению до формирования синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Источником ВИЧ-инфекции являются люди, инфицированные ВИЧ, на любой стадии заболевания, в том числе в инкубационном периоде, который обычно составляет не более 3 месяцев, при наличии иммунодефицитных состояний может увеличиваться до 12 месяцев.

Заразиться ВИЧ-инфекцией можно при:

- незащищенном половом контакте;
- при использовании нестерильных инструментов для немедицинских инвазивных процедур: внутривенном введении наркотиков, нанесении татуировок, проведении косметических, маникюрных и педикюрных процедур и других, связанных с нарушением целостности кожных покровов;
- при переливании крови, ее компонентов и препаратов, пересадке органов и тканей, использовании донорской спермы, донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного донора;
- через медицинский инструментарий для парентеральных вмешательств, медицинские изделия, растворы, контаминированные ВИЧ и не подвергшиеся обработке в соответствии с требованиями нормативных документов;

- инфицирование ребенка от ВИЧ-инфицированной матери во время беременности, родов и при грудном вскармливании.

ВИЧ инфекция не передаётся при поцелуях, рукопожатии, пользовании общей посудой, столовыми приборами, полотенцами, укусами насекомых. На сегодня ВИЧ-инфекция это не смертельный приговор.

Главными мерами профилактики ВИЧ-инфекции являются: соблюдение здорового образа жизни, выбор постоянного полового партнера, использование барьерных средств защиты (презервативы) при половом контакте, предупреждение употребления инъекционных наркотиков, использование индивидуальных бритвенных станков, зубных щеток, маникюрных наборов; отказ от получения инвазивных медицинских и немедицинских услуг в сомнительных организациях. При посещении косметологических салонов, парикмахерских, тату-салонов и получении других услуг с применением многоразового инструментария, необходимо убедиться, что весь используемый инструментарий тщательно стерилизован, так же необходимо соблюдать меры предосторожности при проведении медицинских манипуляций. Для профилактики заражения новорожденных от ВИЧ-инфицированных беременных женщин главным мероприятием является получение химиопрофилактики беременными, для чего необходимо своевременно стать на диспансерный учет в женскую консультацию.